

AZUCENA BLANCA

Solanum tuberosum ssp andigena

Menos extendida que la Azucena Negra, pero de calidad culinaria excelente. Su zona de mayor producción es Icod El Alto, el municipio de Los Realejos, área de una enorme importancia en la producción de papa de consumo y de semilla de las variedades tradicionales tinerfeñas.

PLANTA

Hábito planta: decumbente
Nº de tallos principales: medios (4-8)
Color del tallo: verde con pocas manchas
Altura de la planta en floración: mediano (75-100 cm)
Grado de floración: profuso
Madurez de follaje: intermedio-tardío (120 a 180 días)




HOJAS

Forma del foliolo terminal: anchamente elíptico



Forma de la base del foliolo terminal: redondeado



Forma del primer foliolo lateral: anchamente elíptico

Ángulo de divergencia entre la hoja y el tallo: 50°

FLOR

Color del pedicelo: pigmentado bajo la articulación

Color del cáliz: predominantemente verde


Forma de la corola: pentagonal



Color predominante de la flor: morado oscuro

Color secundario de la flor: blanco

Distribución del color secundario de la flor: en ambos lados del acumen




Tamaño de la flor: pequeña (< 30 mm)

Pigmentación de las anteras: sin antocianinas

Exención del estigma: moderadamente exerto (2-5 mm)

TUBÉRCULO

Forma: predominantemente redondo



Color piel: marrón pálido salpicado morado

Color carne: crema

Profundidad ojos: superficiales (<2 mm)

Textura piel: intermedia

Nº ojos por tubérculo: intermedios (8-10)

Color primario brotes: violeta

Color secundario brotes: blanco

Distribución del color secundario brotes: en pocas manchas a lo largo

