

# BONITA NEGRA

*Solanum tuberosum ssp andigena*

Muy apreciada por agricultores y consumidores entendidos, quien en muchos casos la consideran de alto valor gastronómico. sin embargo, es una variedad de papa muy añera, lo que hace que su cultivo sea minoritario con respecto al resto que constituyen el grupo de las Bonitas.


## PLANTA

- Hábito planta: decumbente  
Nº de tallos principales: medios (4-8)  
Color del tallo: pigmentado con abundante verde  
Altura de la planta en floración: corta (<75 cm)  
Grado de floración: moderado  
Madurez de follaje: intermedio-tardío (120 a 180 días)



## HOJAS

Forma del foliolo terminal: anchamente elíptico



Forma de la base del foliolo terminal: redondeado




Forma del primer foliolo lateral: anchamente elíptico

Ángulo de divergencia entre la hoja y el tallo: 50°

## FLOR


- Color del pedicelo: Totalmente pigmentado  
Color del cáliz: pigmentado con manchas verdes  
Forma de la corola: pentagonal



Color predominante de la flor: morado oscuro

Color secundario de la flor: blanco

Distribución del color secundario de la flor: en ambos lados del acumen




Tamaño de la flor: pequeña (< 30 mm)

Pigmentación de las anteras: sin antocianinas

Exención del estigma: moderadamente exerto (2-5 mm)

## TUBÉRCULO

Forma: predominantemente redondo



Color piel: morado

Color carne: amarillo claro

Profundidad ojos: ligeramente profundos (2-4 mm)

Textura piel: intermedia

Nº ojos por tubérculo: muchos (> 10)

Color primario brotes: violeta

Color secundario brotes: blanco

Distribución del color secundario brotes: en la base

