ESPAÑOL

Triticum turgidum ssp. *durum* var. *africanum* CBT00330

Municipio: San Cristóbal de La Laguna Fecha recolección: 2004

PARTE VEGETATIVA

Hábito de crecimiento: semierecto
Pelos hoja: presencia
Pelos aurícula: ausencia
Pigmentación aurícula: débil
Serosidad vaina: ausente o muy débil
Serosidad raquis espiga: ausente o muy débil
Serosidad hoja: ausente o muy débil
Precocidad: tardío (111-120 días)
Nº de hijos: 2
Nº espigas/planta: 3
Altura planta (cm): bajo (70,95)
Altura paja(cm): pequeña (78,87)
Sección paja: 1/4 lleno



ESPIGA

Forma espiga: fusiforme



Longitud raquis (cm): 3,88
Longitud espiga (cm): 4,85
Ancho cara/perfil espiga (mm): 11,33/12,78
Densidad espiga: densa

Nº espiguillas: 11,5
Longitud/ancho espiguilla (mm): 13,83/9,6
Abertura espiguilla : ligeramente flaveliforme
Longitud barbas o aristas (cm): aristada (7,75)
Color barbas o aristas: negra en la base
Divergencia: paralelas al raquis
Nº granos/espiguilla: 3
Color gluma: blanca
Longitud gluma (mm): mediana (9,12)
Forma gluma: alargada
Longitud diente apical (mm): medio (3,38)
Forma diente apical: ligeramente curvado



Ancho hombro (mm): muy estrecho (0,16)
Forma hombro: elevado



Pilosidad externa: presente
Pilosidad interna: nula o muy escasa



GRANO

Nº granos/espiga: 34,5
Longitud del grano(mm) semilargo (7,66)
Forma del grano: semialargado
Corte transversal: semivítreo
Color del grano: rojo
Peso 1000 semillas (g): 40,1