


MORA

Solanum tuberosum ssp *tuberosum*

Variedad cultivada especialmente en el Parque Rural de Teno y de la que existe una descripción muy antigua. Se ha clasificado recientemente dentro de la subsp. *tuberosum*. En algunos lugares se le conoce también como Brasileña o Grasiñeña.

PLANTA

- Hábito planta: decumbente
Nº de tallos principales: pocos (2-3)
Color del tallo: verde con muchas manchas
Altura de la planta en floración: corta (<75 cm)
Grado de floración: muy escaso
Madurez de follaje: intermedio (120 a 149 días)



HOJAS

Forma del foliolo terminal: anchamente elíptico



Forma de la base del foliolo terminal: entre redondeado y cordado



Forma del primer foliolo lateral: anchamente elíptico

Ángulo de divergencia entre la hoja y el tallo: 50°




FLOR

Color del pedicelo: pigmentado debajo de articulación

Color del cáliz: verde con manchas pigmentadas


Forma de la corola: semi-estrellada



Color predominante de la flor: violeta

Color secundario de la flor: blanco

Distribución del color secundario de la flor: en el envés del acumen



Tamaño de la flor: de grande a muy grande (41 a > 30 mm)

Tamaño de la flor: mm)


Pigmentación de las anteras: sin antocianinas

Exención del estigma: moderadamente exerto (2-5 mm)



TUBÉRCULO

Forma: largo oblongo con formas ovoides



Color piel: morado oscuro y motas marrones

Color carne: crema

Profundidad ojos: ligeramente profundos (2-4 mm)

Textura piel: intermedia algo áspera

Nº ojos por tubérculo: muchos (> 10)

Color primario brotes: violeta

Color secundario brotes: blanco

Distribución del color secundario brotes: --

