


PALMERA BLANCA

Solanum tuberosum ssp tuberosum

Dentro del grupo de las Palmeras parece el cultivar que se encuentra en mayor peligro de desaparición. Para los agricultores el grupo de las Palmeras son papas buenas de comer cuando están recién recoletadas.

PLANTA

Hábito planta: erecto
Nº de tallos principales: pocos (2-3)
Color del tallo: verde con pocas manchas
Altura de la planta en floración: corta (<75 cm)
Grado de floración: escaso y flores que se caen (1-3)
Madurez de follaje: intermedio (120 a 149 días)




HOJAS

Forma del foliolo terminal: anchamente elíptico



Forma de la base del foliolo terminal: cuneado



Forma del primer foliolo lateral: anchamente elíptico

Ángulo de divergencia entre la hoja y el tallo: 40°




FLOR

Color del pedicelo: predominantemente verde

Color del cáliz: verde


Forma de la corola: pentagonal



Color predominante de la flor: lila

Color secundario de la flor: blanco

Distribución del color secundario de la flor: bandas en el envés



de intermedio a grande (30 a 50


Tamaño de la flor: mm)

Pigmentación de las anteras: sin antocianinas

Exención del estigma: moderadamente exerto (2-5 mm)

TUBÉRCULO

Forma: redonda



marrón pálido, con salpicado

Color piel: morado

Color carne: amarillo claro

Profundidad ojos: ligeramente profundos (2-4 mm)

Textura piel: intermedia

Nº ojos por tubérculo: intermedios (8-10)

Color primario brotes: morado

Color secundario brotes: blanco

Distribución del color secundario brotes: en el ápice

