

RAYADA o JORGE

PLANTA

Hábito planta: semi - erecto
Nº de tallos principales: medios (4 y 8)
Color del tallo: pigmentados con abundante verde
Altura de la planta en floración: corta (< 75)
Grado de floración: escaso
Madurez de follaje: muy precoz (<90 días desde la siembra)



HOJAS

Forma del foliolo terminal: elíptico



Forma de la base del foliolo terminal: redondeado



Forma del primer foliolo lateral: elíptico

Ángulo de divergencia entre la hoja y el tallo: --




FLOR

Color del pedicelo: pigmentado ligera a lo largo en articulación

Color del cáliz: verde con muchas manchas pigmentadas de rotáceo a rotáceo pentagonal (categoría propia)


Forma de la corola: propia



Color predominante de la flor: lila

Color secundario de la flor: blanco

Distribución del color secundario de la flor: bandas en ambas caras



Tamaño de la flor: --


Pigmentación de las anteras: sin antocianinas

Exención del estigma: --



TUBÉRCULO

Forma: largo - oblongo



Color piel: morado

Color carne: violeta

Profundidad ojos: ausente

Textura piel: ausente

Nº ojos por tubérculo: crema

Color primario brotes: medios

Color secundario brotes: --

Distribución del color secundario brotes: --

